

자궁경부암은 정기 검진으로 예방이  
가능합니다.



오늘 의료진을 찾아서 자궁경부  
검진을 상의하십시오.

## NATIONAL CERVICAL SCREENING PROGRAM

A joint Australian, State and Territory Government Program



팍 테스트가 바뀌었습니다.  
정확도는 높아지고, 재검 간격은 늘어납니다.

### 더 자세한 정보를 얻을 수 있습니까?

새로운 자궁경부 검사에 관해 문의가 있으시면  
의료진과 진료예약을 하시기 바랍니다.

자궁경부 검사에 관한 자세한 사항은 웹사이트  
[cancerscreening.gov.au/cervical](https://cancerscreening.gov.au/cervical)를 찾거나  
전화 **13 15 56**로 문의하십시오.

전국 자궁경부 검진 프로그램은 호주정부와 주  
/ 테리토리 정부의 공동 프로그램입니다.

영어가 모국어가 아니거나 통역이 필요하시면  
**13 14 50**번의 통번역 서비스(TIS)로  
연락하십시오 (시내통화 요금).

연령에 상관없이 집에서 부정출혈, 통증,  
분비물 등의 증상이 있으면 즉시 의료진을  
찾으셔야 합니다.



Australian Government


## 자궁경부 선별검진

호주 자궁경부 검진이 새로워졌습니다. 종전의 팸 테스트에서 5년마다 받는 새로운 자궁경부 검사로 대체됩니다. 최신 의학과 과학기술의 검증에 따르면 5년마다 자궁경부 검사를 받는 것이 2년마다 받는 팸 테스트만큼 안전하며 더욱 효과적입니다.

새로운 검사는 빠르고 간단한 과정을 통해 자궁의 건강상태를 확인합니다. 이전에 팸 테스트를 받은 적이 있다면 새로운 검사의 방법을 동일하게 느끼실 수 있습니다.

검사과정은 다소 불편할 수 있으나 아프지는 않습니다. 통증이 있는 경우에는 의료진에게 즉시 말씀하십시오. 또한 여성 의료진에게 검사를 받도록 요청하셔도 됩니다.

자궁경부는 질 상부에 위치해 있는 자궁의 시작부분(경부)입니다. (아래 그림 참조)



## 자궁경부 검사가 왜 더 정확한가요?

검사를 받을 때는 비슷하게 느껴지겠지만 검체를 보관하고 검사하는 방법이 다릅니다. 최신 의학과 과학기술의 검증에 따르면 새 자궁경부 검사가 자궁경부에서 이형 세포조직을 유발하는 인체유두종 바이러스(HPV)의 초기 발견에 더욱 효과적입니다.

자궁경부암은 쉽게 발생하는 질병이 아니며, HPV 바이러스로 인한 이형 세포조직이 자궁경부암으로 진행되는 데는 보통 10년이 걸립니다.

전국 자궁경부 검진 프로그램 (National Cervical Screening Program)의 변경으로 최대 30%의 더 많은 여성을 자궁경부암으로부터 보호할 수 있을 것이 예상됩니다.

자궁경부암에 대한 더 많은 연구지식과 변경된 검사 방식으로 이제 더 자신감을 가질 수 있게 되었습니다. 새로운 자궁경부 검사는 더욱 정확하고 효과적이며 안전한 검사로, 2년마다 받아야 하는 팸 테스트 대신 5년에 한 번씩 검사를 받도록 합니다.

검사 결과는 시술 의료진에게 2주 후에 통보되어 검진자에게 전달될 수 있습니다.

**의료진이란 지역 의료센터, 여성전문 의원, 가족계획과 성 건강 상담소, 호주원주민 의료 서비스에 근무하는 일반의(GP), 간호사나 의사로서 이들 모두가 자궁경부 검진을 할 수 있습니다. 또한 원하시는 경우 여성 의료진을 요청하실 수 있습니다.**

## 자궁경부 검사 대상은 누구인가요?

25-74세 사이의 여성으로 성경험이 있는 사람은 모두 74세까지 5년 마다 정기적으로 자궁경부 검사를 받으셔야 합니다.

첫 자궁경부 검사는 만 25세가 되는 해, 또는 지난번 팸 테스트를 받은지 2년 후입니다. 검사결과가 정상이면 다음 재검사는 5년 후에 받습니다.

**매년 호주에서 800여명의 여성이 자궁경부암 진단을 받습니다. 그러나 자궁경부암은 대부분 정기 검진으로 예방 가능합니다.**

